

ГАРДАПРОСТ® (GARDAPROST)

Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище — источника куркумина, полифенолов (в т.ч. катехинов, эпигаллокатехин-галлата), генистеина.

Состав: экстракт зеленого чая (Camellia sinensis extract), генистеин (Genistein) (из соевых бобов), куркумин (Curcumin), капсула (желатин, диоксид титана (краситель)), оксид железа (краситель).

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

В суточной дозе (1 капсула) содержится:

Ингредиент	Содержание в суточной дозе, не менее, мг	% от адекватного уровня потребления*
Куркумин	25	50
Генистеин	65	130**
Катехины, в том числе	150	150***
Эпигаллокатехин-галлат	75	75

* Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления (150 мг).
***Не превышает верхний допустимый уровень потребления (300 мг).

Возможно окрашивание капсул в оранжевый цвет.

Форма выпуска: 30 капсул по 350 мг.

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°С.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Изготовитель: ООО «Витамер», РФ, 117623, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, ул. 2-я Мелитопольская, д. 19, к. 2, кв. 57.

Адрес производства: РФ, 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Совхозная, д.11.

По заказу ООО «ЭСЭЙЧ ФАРМА», РФ, 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 10, строение 18, этаж 10, ком. 6А.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: ООО «ЭСЭЙЧ ФАРМА», РФ, 109428, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский, дом 10, строение 18, этаж 10, ком. 6А, **тел.:** +7 (495) 178 08 23, **e-mail:** info@shpharma.ru, **www.shpharma.ru**

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарственным средством.

Дополнительная информация

Предстательная железа — это важный орган мужской репродуктивной и мочевой системы. К сожалению, с возрастом у некоторых мужчин могут возникнуть различные проблемы с предстательной железой, такие как доброкачественная гиперплазия и хронический простатит, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие мужчины.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, аденома простаты) — это одно из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин. ДГПЖ встречается у половины мужчин старше 50 лет. При этом заболевании в предстательной железе образуются очаги избыточного роста и деления клеток. Рост этих узелков носит доброкачественный характер, но, сдавливая мочеиспускательный канал, может приводить к таким серьезным последствиям, как острая и хроническая задержка мочи, а также хроническая почечная недостаточность. Основными проявлениями ДГПЖ являются учащенное мочеиспускание, особенно по ночам, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и др.

При больших размерах предстательной железы, тяжёлых нарушениях мочеиспускания и угрозе острой задержки мочи пациенту показано хирургическое удаление аденоматозных узлов. В остальных случаях показано консервативное лечение.

При ДГПЖ особенно оправданным является применение средств, направленных на уменьшение скорости избыточного роста аденоматозных узлов, нормализацию клеточного цикла в предстательной железе. Это позволяет замедлить и, в ряде случаев, полностью остановить прогрессирование заболевания.

Хронический простатит (ХП) – это одна из наиболее распространенных проблем в урологической практике и самое распространенное урологическое заболевание среди мужчин моложе 50 лет: 35–50% мужчин хотя бы один раз в жизни сообщали о симптомах нижних мочевых путей (СНМП), характерных для простатита; у 8–11% европейцев и 3–16% американцев простатит является рецидивирующим заболеванием. По данным российских исследований распространенность ХП еще выше – до 40%. Существует несколько типов хронического простатита: бактериальный и абактериальный, который в свою очередь делится на воспалительный и невоспалительный. Причинами абактериального простатита могут быть иммунные нарушения, застойные явления, нарушения кровообращения в предстательной железе, гормональные нарушения.

Основными симптомами ХП (вне зависимости от его причины) являются боль (в промежности, в мошонке, нижней части живота), нарушения мочеиспускания, сексуальная дисфункция.

Учитывая сложную этиологию ХП, при его лечении специалисты применяют комплексную терапию противовоспалительными агентами, препаратами, направленными на улучшение кровообращения/метаболизма в предстательной железе, а также средствами, повышающими локальный иммунитет.

«ГАРДАПРОСТ®» («GARDAPROST») представляет собой комплекс биологически активных компонентов, комбинация которых благоприятно воздействуют на различные клеточные механизмы, предупреждающие развитие патологических изменений в предстательной железе при ДГПЖ и ХП (при аденоме простаты и хроническом простатите).

Характеристика компонентов комплекса «ГАРДАПРОСТ®» («GARDAPROST»)

Многочисленные литературные медицинские данные* подтвердили эффективность и безопасность компонентов, входящих в комплекс «ГАРДАПРОСТ®», при его применении у мужчин с ДГПЖ и ХП (с аденомой простаты и хроническим простатитом):

Куркумин

При ДГПЖ:

- способен индуцировать программируемую клеточную гибель (апоптоз) в избыточно делящихся клетках;
- уменьшает активность рецепторов к тестостерону в клетках предстательной железы;
- снижает массу и объем предстательной железы при ДГПЖ за счет уменьшения выработки факторов клеточного роста в предстательной железе.

При хроническом простатите:

- снижает уровень провоспалительных молекул в ткани предстательной железы, что уменьшает отечность тканей;
- снижает уровень маркеров окислительного стресса, защищая ткани от повреждения;
- улучшает качество мочеиспускания.

Генистеин

При ДГПЖ:

- уменьшает риск возникновения опухолевых заболеваний предстательной железы;
- оказывает антипролиферативную активность (уменьшает интенсивность деления клеток) в тканях предстательной железы;
- замедляет рост клеток предстательной железы (чем выше уровень генистеина в предстательной железе, тем меньше её объем).

При хроническом простатите:

- снижает активность ферментов (циклооксигеназы-2), ответственных за развитие воспаления;
- уменьшает число очагов воспаления в предстательной железе;
- снижает давление в мочевом пузыре, нормализуя мочеиспускание.

Эпигаллокатехин-3-галлат

При ДГПЖ:

- нормализует активность инсулиноподобного фактора роста, приводя к снижению скорости роста предстательной железы при ДГПЖ;
- снижает активность рецепторов, отвечающих за избыточный рост клеток предстательной железы.

При хроническом простатите:

- уменьшает степень разрастания соединительной рубцовой ткани в предстательной железе;
- стабилизирует межклеточные структуры и оболочку клеток, снижая степень повреждения предстательной железы при воспалении;
- уменьшает распространенность воспалительного процесса и снижает за счет этого уровень боли.

* Источники литературных медицинских данных:

Pulido-Moran et al., Molecules. 2016 Feb 25;21(3):264. doi: 10.3390/molecules21030264.
Tsui KH, Feng TH, Lin CM, Chang PL, Juang HH J Androl. 2008 Nov-Dec; 29(6):661-8.
Aggarwal BB, Gupta SC, Sung B. Br J Pharmacol. 2013;169(8):1672-92.
Kim SK, Seok H, Park HJ, et al. BMC Complement Altern Med. 2015;15:380. DOI:10.1186/s12906-015-0825-y
Azimi H et al. Inflamm Allergy Drug Targets. 2012 Jun;11(3):207-21. DOI : 10.2174/187152812800392715
Fotsis T, Pepper M, Adlercreutz H, et al J Nutr 125: 790S-797S, 1995.
Brössner C et al., Urology. 2004 Oct;64(4):707-11. . DOI 10.1016/j.urology.2004.04.046"
Chen J, Song H. Environ Toxicol Pharmacol. 2016 Jul;45:315-20. DOI: 10.1016/j.etap.2016.06.015.
Zhou J, Lei Y, Chen J, Zhou X. Int Immunopharmacol. 2018 Nov;64:162-169. DOI: 10.1016/j.intimp.2018.08.038

