

Оценка состояния пациента с доброкачественной аденомой простаты по международной шкале симптомов (IPSS)¹

Ф.И.О. _____ Возраст _____ Дата заполнения _____

Шкала IPSS	0	1	2	3	4	5
	Никогда	Реже, чем 1 раз в неделю	Реже, чем в половине случаев	Примерно в половине случаев	Чаше, чем в половине случаев	Почти всегда
1. Как часто в течение последнего месяца у Вас было ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?						
2. Как часто в течение последнего месяца у Вас была потребность мочиться чаще , чем через 2 часа после последнего мочеиспускания?						
3. Как часто в течение последнего месяца у Вас было прерывистое мочеиспускание ?						
4. Как часто в течение последнего месяца Вам было трудно временно воздержаться от мочеиспускания?						
5. Как часто в течение последнего месяца у Вас была слабая струя мочи ?						
6. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось натуживаться , чтобы начать мочеиспускание?						
7. Как часто в течение последнего месяца Вам приходилось вставать ночью , чтобы помочиться?						
Суммарный балл по IPSS						

Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось жить с имеющимися у Вас проблемами с мочеиспусканием до конца жизни?	Прекрасно	0	Неудовлетворительно	4
	Хорошо	1	Плохо	5
	Удовлетворительно	2	Очень плохо	6
	Смешанное чувство	3		

1. Адаптация EUA Guidelines on Urinary Incontinence, 2015